




Pholiota conissans (Fr.) Kuyper et Tjall.-Beuk.

Lápi tőkegomba



Pholiota conissans (Fr.) Kuyper et Tjall.-Beuk.

Lápi tőkegomba

Kalap: 0,8–3,5 cm, félgömb alakúból kiterülő, ellaposodó, nyálkás-tapadós felületű, a peremén fátyolmaradványokkal, a szélén fakósárga, a közepe felé narancsbarnás színű. **Lemezek:** keskenyek, sűrűn állók, foggal tönkhöz nőttek, fiatalon krémsárgák, később rozsdabarnára színeződők, világosabb lemezéllel. **Tönk:** 2–5,5 × 0,3–0,5 cm, vékony, ritkán 2–4 termőtest összenőve, fiatalon gyenge pókhálós burok fedi a lemezeket, sima, finoman szálás felületű, fakósárga színű, a tövénél barnuló. **Hús:** vékony, halványsárgás, a tönk tövével barnás színű, enyhe, kissé fanyar ízű, nincs jellegzetes szaga. **Spórák:** 6,2–8 × 3,5–4,5 μm, nyújtottan ellipszis vagy bab alakúak, vastag falúak, csírapórusal. **Termőhely:** nedves élőhelyeken, főleg fűzek (*Salix*) lombkorhadékán, de üde réteken, különböző fűvek korhadékán előforduló karakterfaj. **Lelőhely:** Borsodi-Mezőség, Muhi, *Salix* lombkorhadékán, 1988. május 12.

Leg., det., herb.: Albert L. 88/4

Fotó: Albert N^o 1527

Pileus: 0.8–3.5 cm, from hemispherical expanding, applanate, glutinous, sticky, with veil remnants at margin, pale yellow, brownish orange towards centre. **Lamellae:** narrow, crowded, emarginate, cream-yellow when young, later rusty brown, with lighter edge. **Stipe:** 2–5.5 × 0.3–0.5 cm, thin, rarely in group of 2–4 fruit-bodies, with fine cobweb-like partial veil, smooth, finely fibrillose, pale yellow, becoming brownish at base. **Context:** thin, light yellowish, brownish at base, taste mild or slightly unpleasant, smell indistinct. **Spores:** 6.2–8 × 3.5–4.5 μm, narrowly ellipsoid or phaseoliform, thick-walled, with germ pore. **Habitat:** in wet places, mostly on the litter and other remnants of willows (*Salix*), or in moist grasslands, on various decaying graminoids. **Locality:** Hungary, Borsodi-Mezőség, Muhi, on decaying leaves of willow (*Salix*), 12 May 1988.